

# 大鼠脾脏单核细胞

**本产品仅供科研实验使用**

## 产品简介

产品名称 : 大鼠脾脏单核细胞

产品品牌 : 酶联生物

组织来源 : 脾脏

产品规格 : 5×10<sup>5</sup>cells/T 25 细胞培养瓶

## 细胞简介

大鼠脾脏单核细胞分离自脾脏组织；脾脏是机体最大的免疫器官，占全身淋巴组织总量的25%，含有大量的淋巴细胞和巨噬细胞，是机体细胞免疫和体液免疫的中心。位于左季肋区后外方肋弓深处，与9-11肋相对，长轴与第10肋一致。

膈面与膈肌和左肋膈窦相邻，前方有胃，后方与左肾、左肾上腺毗邻，下端与结肠脾沟相邻，地柔软的网状内皮细胞器官。单核细胞（monocytes）是体积最大的白细胞。其细胞核常偏位，呈多形性，如卵圆形、肾形(a)、马蹄形(b)、不规则形(c)等，常有折叠感(c)；染色质呈疏松网状，着色较浅。胞质较多，嗜碱性，但因含大量细小的嗜天青颗粒而染成灰蓝色，颗粒含过氧化物酶。单核细胞是血液中最大的血细胞。

目前认为它是巨噬细胞的前身，具有明显的变形运动，能吞噬、清除受伤、衰老的细胞及其碎片。单核细胞还参与免疫反应，在吞噬抗原后将所携带的抗原决定簇转交给淋巴细胞，诱导淋巴细胞的特异性免疫反应。

单核细胞也是对付细胞内致病细菌和寄生虫的主要细胞防卫系统，还具有识别和杀伤肿瘤细胞的能力。淋巴细胞则为具有特异性免疫功能的细胞。T 淋巴细胞主要参与细胞免疫反应而 B 淋巴细胞参与体液免疫反应。

### 方法简介

酶联生物实验室分离的大鼠脾脏单核细胞采用密度梯度离心法结合差速贴壁法制备而来，细胞总量约为  $5 \times 10^5$  cells/瓶。

### 质量检测

酶联生物实验室分离的大鼠脾脏单核细胞经 CD 14 免疫荧光鉴定，纯度可达 90% 以上且不含有 H IV -1、H BV 、H C V 、支原体、细菌、酵母和真菌等。

### 培养信息

培养基：含 FBS、M -C SF、Penicillin、Streptomycin 等

换液频率：每 2-3 天换液一次 生长特性 半贴壁半悬浮 细胞形态 巨噬细胞样

传代特性：不传代，不增殖，存活 1-2 周

传代比例：不传代

消化液：0.25% 胰蛋白酶

培养条件 : 气相 : 空气 , 95% ; C O<sub>2</sub> , 5%

大鼠脾脏单核细胞体外培养周期有限 ; 建议使用酶联生物配套的专用生长培养基及正确  
的操作方法来培养 , 以此保证该细胞的最佳培养状态。

### 细胞培养状态

发货时发送细胞电子版照片

### 使用方法

大鼠脾脏单核细胞是一种半贴壁半悬浮细胞 , 细胞形态呈巨噬细胞样 , 在酶联生物技术部  
标准操作流程下 , 细胞不传代 , 不增殖 , 存活 1-2 周 ; 建议您收到细胞后尽快进行相关验。

客户收到细胞后 , 请按照以下方法进行操作。

1. 取出 T 25 细胞培养瓶 , 用 75% 酒精消毒瓶身 , 拆下封口膜 , 放入 37°C 、 5% C O<sub>2</sub> 、  
饱和湿度的细胞培养箱中静置 3-4h , 以稳定细胞状态。

#### 2. 半贴壁半悬浮细胞处理

1 ) 收集 T25 细胞培养瓶中的培养基至 50ml 离心管中 , 用吸管吸取 PBS , 吹洗细胞培养瓶  
1-2 次 , 收集清洗液 ; 经 1200-1500rpm 离心 3min , 弃上清 , 收集细胞沉淀①。

2 ) 添加 0.25% 胰蛋白酶消化液 1m L 至 T 25 培养瓶中 , 轻微转动培养瓶至消化液覆盖整  
个培养瓶底后 , 吸出多余胰蛋白酶消化液 , 37°C 温浴 1-3min ; 倒置显微镜下观察 , 待细胞  
回缩变圆后 , 再加入 5ml 完全培养基终止消化。

3 ) 用吸管轻轻吹打混匀 , 收集细胞悬液至离心管中 ; 经 1200-1500rpm 离心 3min , 弃

上清，收集细胞沉淀②。

4 ) 吸取 5ml 新鲜完全培养基，重悬细胞沉淀①、细胞沉淀②,把①、②混匀。

5 ) 用吸管轻轻吹打混匀、分散细胞，按实验需求接种于实验器皿内，然后补充适量新鲜的完全培养基，置于 37°C、5% CO<sub>2</sub>、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养。

6 ) 待细胞状态稳定后，用于实验；可以每 2-3 天换液一次新鲜的完全培养基。

### 3. 细胞实验

因原代细胞贴壁特殊性，贴壁的原代细胞在消化后转移至其他实验器皿（如玻璃爬片、培养板、共聚焦培养皿等）时，需要对实验器皿进行包被，以增强细胞贴壁性，避免细胞因没贴好影响实验；包被条件常选用鼠尾胶原 I ( 2-5μg/cm<sup>2</sup> )，多聚赖氨酸 PLL ( 0.1mg/ml )，明胶 ( 0.1% )，依据细胞种类而定。悬浮/半悬浮细胞无需包被。

### 注意事项

1. 培养基于 4°C 条件下可保存 3-6 个月。
2. 在细胞培养过程中，请注意保持无菌操作。
3. 传代培养过程中，胰酶消化时间不宜过长，否则会影响细胞贴壁及其生长状态。
4. 建议客户收到细胞后前 3 天每个倍数各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和酶联生物技术部沟通。由于运输的原因，个别敏感细胞会出现不稳定的情况，请及时和我们联系，详尽告知细胞的具体情况，以便我们的技术人员跟踪、回访直至问题得到解决。

订购热线 : 4008-898-798



[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

咨询 QQ : 2881505714

咨询电话 : 13524666836(微信同号)

